

Clinical Transplant Services (Servicios Clínicos de Trasplante)

Mail Code: CB569 • 3181 SW Sam Jackson Park Rd. • Portland, OR 97239-3098

Tel.: 503/494-8500 • Fax: 503/494-4492 • Línea gratuita: 800/452-1369, ext. 8500

Título: **Criterios de selección de pacientes para ser donantes vivos de riñón**

- I. Enfermedades que aumentan el riesgo con la donación de riñón
 - A. afección subyacente para la que el tratamiento podría ser nefrotóxico (p. ej., artritis reumatoide, dolor crónico);
 - B. alteraciones de la coagulación;
 - C. tabaquismo;
 - D. antecedentes de alteraciones renales significativas (p. ej., cálculos, pielonefritis, cáncer);
 - E. resultados positivos en los anticuerpos contra el núcleo de la hepatitis B;
 - F. síndrome metabólico;
 - G. obesidad;
 - H. antecedentes de depresión, enfermedad mental o consumo de sustancias;
 - I. colectomía total.
- II. Contraindicaciones absolutas
 - A. incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO imposible de tratar con inmunomodulación; se ofrece intercambio de donantes;
 - B. incompatibilidad cruzada de células T o B imposible de tratar con inmunomodulación; se ofrece intercambio de donantes;
 - C. IMC >32;
 - D. ser menor de 21 años;
 - E. hipertensión;
 - F. enfermedad renal o función renal insuficiente;
 - G. riesgo operativo moderado de mortalidad y morbilidad;
 - H. metabolismo de la glucosa significativamente deficiente; antecedentes de diabetes gestacional en un donante;
 - I. <40 años de edad o <10 años desde el diagnóstico;
 - J. cirugía de derivación intestinal;
 - K. enfermedades psiquiátricas activas que requieran tratamiento antes de la donación, incluida cualquier evidencia de tendencias suicidas;
 - L. disfunción mental significativa
 1. incapacidad para dar su consentimiento informado
 2. incapacidad para comprender la naturaleza del procedimiento
 3. incapacidad para cooperar en la atención médica requerida después de la cirugía
 - M. alto grado de sospecha de coerción sobre el donante;
 - N. alto grado de sospecha de intercambio financiero ilegal entre el donante y el receptor;
 - O. apoyo financiero o social insuficiente;
 - P. consumo activo de drogas adictivas, incluido el alcohol;
 - Q. enfermedades contagiosas significativas;
 - R. resultado positivo en la prueba de hepatitis C;
 - S. resultado positivo en la prueba de VIH;
 - T. resultado positivo en la prueba de HTLV;
 - U. resultado positivo en la prueba de antígeno de superficie de la hepatitis B;
 - V. neoplasia activa o tratada de manera incompleta;
 - W. evidencia de infección aguda sintomática (hasta que se revierta);
 - X. ser actualmente un recluso en un establecimiento penitenciario, en libertad condicional o tener problemas legales pendientes con posibilidad de encarcelamiento;
 - Y. el donante decide no proceder con la cirugía.
- III. Referencias:

OHSU Kidney/Pancreas Transplant Protocol Handbook (Manual del protocolo para el trasplante de riñón o páncreas de OHSU), Capítulo 2.13, Pre-Transplant Evaluations (Evaluaciones previas al trasplante), LaPointe Rudow, D., et al. A Clinician's Guide to Donation and Transplantation (Guía del médico para la donación y el trasplante). Lenexa, KS: Applied Measurement Professionals, Inc.; 2006. Capítulos 16,17; PHS Guideline for Reducing HIV, Hepatitis B Virus, and Hepatitis C Virus Transmission Through Organ Transplantation (Pautas del PHS para reducir la transmisión del VIH, el virus de la hepatitis B y el de la hepatitis C a través del trasplante de órganos) (2013).